

# 化学療法プロトコール・レジメン登録用紙

登録プロトコール名	CBDCA+PTX+BV+Atezolizumab
診療科	内科
申請者名	佐々木 洸太
適応	非小細胞肺癌
登録年月日	2022.04.18

薬剤名称(成分名)	投与経路	標準投与量
テセントリク(アテゾリズマブ)	div	1200mg/body
カルボプラチン	div	AUC 6
パクリタキセル	div	200mg/m <sup>2</sup>
ベバシズマブ	div	15mg/kg

承認 委員長	承認 副委員長	承認 事務局

投与スケジュール: 3週間毎、4~6コースまで

投与順	Rp	経路・時間	投与スケジュール																												
			-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	アプレピタントカプセル(1日目 125mg、2・3日目 80mg)	p.o		●	●	●																									
②	血管確保用 生食50mL			●																											
③	プライミング用 生食50mL			●																											
④	アテゾリズマブ1200mg + 生食250mL	div 60分/30分		●																											
⑤	フラッシュ用 生食50mL			●																											
⑥	アロキシ0.75mg/50mL + ポララミン5mg + ファモチジン20mg + デキサート9.9mg	div 15分		●																											
⑦	パクリタキセル(200mg/m <sup>2</sup> ) + 生食500mL	div 3時間		●																											
⑧	カルボプラチン(AUC6) + 生食250mL	div 30分		●																											
⑨	ベバシズマブ(15mg/kg) + 生食100mL [全量100mL]	div 90分/60分/30分		●																											
⑩	フラッシュ用 生食50mL			●																											

(※)投与時間  
 アテゾリズマブ・・・初回は60分、初回投与の忍容性が良好であれば2回目以降は30分まで短縮可  
 ベバシズマブ・・・初回は90分、2回目60分、忍容性が良好であれば3回目以降は30分まで短縮可

(※)アテゾリズマブ、パクリタキセル：フィルター付き輸液セット [SA-PNF320NM] を使用

(※)パクリタキセル：点滴セットに可塑剤としてDEHPを含有しているものの使用は避ける

開始予定日 あり 年 月 日 なし