

化学療法プロトコール・レジメン登録用紙

登録プロトコール名	Tmab+CapeOX
診療科	外科
診療科責任者	
申請者名	佐々木 洸太
適応	HER2陽性進行胃癌
登録年月日	2021.06.28

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
ゼローダ	p.o(分2)	BSA 1.36㎡未満:2400mg/日 1.36~1.66㎡未満:3000mg/日 1.66~1.96㎡未満:3600mg/日 1.96㎡以上:4200mg/日
オキサリプラチン(L-OHP)	div	130mg/m ²
トラスツズマブ(Tmab)	div	[初回] 8mg/kg [2回目以降] 6mg/kg

承認	承認	承認
委員長	副委員長	事務局

投与スケジュール: 3週間毎投与

投与順	Rp	経路・時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	イメンドカプセル(1日目 125mg、2・3日目 80mg)	p.o		●	●	●																			●	●	●				
②	血管確保用 生食 50mL			●																					●						
③	グラニセトロンバッグ3mg/50mL+デキサート6.6mg	div 15min		●																					●						
④	オキサリプラチン(130mg/m ²)+5%ブドウ糖液250mL	div 2hr		●																					●						
⑤	[初回のみ] トラスツズマブ(8mg/kg) + 生食 250mL	div 90min		●																											
	[2回目以降] トラスツズマブ(6mg/kg) + 生食 250mL	div ※30min																							●						
⑥	フラッシュ用 生食 50mL			●																					●						
⑦	ゼローダ	po 朝・夕食後		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

※初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降の投与時間は30分間まで短縮可

※ 内科と共通で使用するため電子カルテには「内科」で登録
 ※ ゼローダは電子カルテのプロトコールには登録せず、別途処方する

開始予定日 あり 年 月 日 なし