

# 化学療法プロトコール・レジメン登録用紙

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| 登録プロトコール名 | Atezolizumab + nab-PTX |
| 診療科       | 乳腺外科                   |
| 診療科責任者    |                        |
| 申請者名      | 西 隆                    |
| 適応        | 乳癌                     |
| 登録年月日     | 2021.01.15             |

| 抗がん剤名称           | 投与経路 | 標準投与量                 |
|------------------|------|-----------------------|
| テセントリク(アテゾリス`マブ) | div  | 840 mg/body           |
| アブラキサン           | div  | 100 mg/m <sup>2</sup> |
|                  |      |                       |
|                  |      |                       |

|     |      |     |
|-----|------|-----|
| 承認  | 承認   | 承認  |
| 委員長 | 副委員長 | 事務局 |
|     |      |     |

## 投与スケジュール：4週間毎

| 投与順 | Rp  | 経路・時間         | 投与スケジュール |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
|-----|---|---------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
|     |   |               | -1       | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  |
| ①   | 血管確保・フラッシュ用<br>生食 50mL                          |               |          | ● |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| ②   | プライミング用<br>生食 50mL                              |               |          | ● |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| ③   | テセントリク(840mg/body)+ 生食250mL                     | div<br>60分(※) |          | ● |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| ④   | フラッシュ用<br>生食 50mL                               |               |          | ● |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| ⑤   | デキサート 6.6mg + 生食 50mL                           | div<br>15分    |          | ● |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| ⑥   | アブラキサン(100mg/m <sup>2</sup> ) + 生食 [ 5mg/mLで調製] | div<br>30分    |          | ● |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| ⑦   | フラッシュ用<br>生食 50mL                               |               |          | ● |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |

(※)テセントリク投与時間・・・初回は60分、初回投与の忍容性が良好であれば2回目以降は30分まで短縮可

③ テセントリク：輸液セット [SA-PNF320NM] を使用 (0.2または0.22 μmのインラインフィルターを使用)

⑥ アブラキサン：フィルター付き輸液セットは使用禁 (アルブミン製剤のため)

開始予定日 あり     年     月     日 なし