

化学療法プロトコール・レジメン登録用紙

登録プロトコール名	DTX+CBDCA+HER+PER (TCH+P)
診療科	乳腺外科
診療科責任者	
申請者名	西 隆
適応	乳癌
登録年月日	2019.10.01

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
パージェタ	div	[初回] 840mg
		[2回目以降] 420mg
ハーセプチン(Tmab)	div	[初回] 8mg/kg
		[2回目以降] 6mg/kg
ドセタキセル(DTX)	div	75mg/m ²
パラプラチン(CBDCA)	div	AUC6

承認 委員長	承認 副委員長	承認 事務局

投与スケジュール: 3週毎 6コース

投与順	Rp	経路・時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	イメンドカプセル(1日目125mg、2・3日目80mg)	p.o		●	●	●																			●	●	●				
②	血管確保・フラッシュ用 生食 100mL			●																					●						
③	[初回] パージェタ 840mg + 生食 250mL	div 60min		●																											
	[2回目以降] パージェタ 420mg + 生食 250mL	div ※30min																							●						
④	フラッシュ用 生食 50mL			●																					●						
⑤	[初回のみ] ハーセプチン(8mg/kg) + 生食 250mL	div 90min		●																											
	[2回目以降] ハーセプチン(6mg/kg) + 生食 250mL	div ※30min																							●						
⑥	フラッシュ用 生食 50mL			●																					●						
⑦	アロキシバッグ0.75mg/50mL + デキサート 6.6mg	div 15min		●																					●						
⑧	ドセタキセル(75mg/m ²) + 5%ブドウ糖液 250mL	div 60min		●																					●						
⑨	カルボプラチン(AUC6) + 生食 250mL	div 60min		●																					●						
⑩	②,④,⑥いずれかの残液でフラッシュ			●																					●						

※初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降の投与時間は30分間まで短縮可

(備考)パージェタ
何らかの理由により予定された投与が遅れた場合には、以下の通り投与するのが望ましい。
(1)前回投与日から6週間未満: 420mgを投与
(2)前回投与日から6週間以上: 改めて初回投与量の840mgで投与(次回以降は420mgを3週間間隔)

開始予定日 あり 年 月 日 なし