

化学療法プロトコール・レジメン登録用紙

| | |
|-----------|----------------------|
| 登録プロトコール名 | DTX + トラスツズマブ (毎週投与) |
| 診療科 | 乳腺外科 |
| 診療科責任者 | |
| 申請者名 | 西 隆 |
| 適応 | 転移性乳癌 |
| 登録年月日 | 2018.03.30 |

| 抗がん剤名称 | 投与経路 | 標準投与量 |
|-------------|------|-------------------------------|
| ドセタキセル(DTX) | div | 60mg/m ² |
| ハーセプチン | div | [初回] 4mg/kg [2回目以降] 2mg/kg |

| | | | |
|-----|------|-----|--|
| 承認 | 承認 | 承認 | |
| 委員長 | 副委員長 | 事務局 | |
| | | | |

投与スケジュール: 3週間毎(ドセタキセル:3週毎、ハーセプチン:毎週投与)

| 投与順 | Rp | 経路・時間 | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---------------------------------------|--|---------------|----|---|---|---|---|---|---|---|----|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| ① | 血管確保・フラッシュ用 生食 50mL | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | ● | | | | | | | |
| ② | グラニセトロンバッグ 3mg/50mL + デキサート 6.6mg | div 15min | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | |
| ③ | ドセタキセル(60mg/m ²) + 5%ブドウ糖液 250mL | div 60min | | ● | | | | | | | 休薬 | | | | | | | 休薬 | | | | | | | ● | | | | | | |
| ④ | フラッシュ用 生食 50mL | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | |
| ⑤ | [初回のみ] ハーセプチン(4mg/kg) + 生食 250mL | div 90min | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | [2回目以降] ハーセプチン(2mg/kg) + 生食 250mL | div ※30min | | | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | |
| ⑥ | ①または④の残液でフラッシュ | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | |
| ※初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降の投与時間は30分間まで短縮可 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

開始予定日 あり 年 月 日 なし