

化学療法プロトコール・レジメン登録用紙

登録プロトコール名	ペムプロリズマブ + wPTX + CBDCA(3週毎)
診療科	乳腺外科
申請者名	西 隆
適応	乳癌
登録年月日	2024.01.05

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
キイトルーダ	div	200mg/body
パクリタキセル	div	80mg/m ²
カルボプラチン	div	AUC 5

承認 委員長	承認 副委員長	承認 事務局

投与スケジュール：3週間毎

投与順	Rp	経路・時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	アプレピタントカプセル(1日目125mg、2・3日目80mg)	p.o		●	●	●																									
	デカドロン錠 4mg/日 (2×朝夕食後)	p.o			●	●	●																								
①	血管確保・フラッシュ用 生食 50mL			●							●							●													
②	プライミング用 生食 50mL			●							●							●													
③	キイトルーダ(200mg/body) + 生食 50mL ※フィルター付き輸液セット使用	div 30min		●																											
④	フラッシュ用 生食 50mL			●																											
⑤	パロノセトロン 0.75mg/50mL + デキサート6.6mg + ファモチジン20mg + ポララミン5mg	div 30min		●																											
⑥	デキサート6.6mg + ファモチジン20mg + ポララミン5mg + 生食100mL	div 30min									●							●													
⑦	パクリタキセル(80mg/m ²) + 5%ブドウ糖液 250mL ※フィルター付き輸液セット使用	div 60min		●							●							●													
⑧	カルボプラチン(AUC 5) + 5%ブドウ糖液 250mL	div 60min(※1)		●																											
⑨	フラッシュ用 生食 50mL			●							●							●													

(※1) カルボプラチンは、医師の判断により30分投与可

※ パクリタキセル：アルコールに関する問診必須 (パクリタキセルはアルコールを含有しているため)
点滴後は自動車運転や危険を伴う作業禁止、アルコール過敏症患者：慎重投与

※ キイトルーダ、パクリタキセル：輸液セット [SA-PNF320NM] を使用