

化学療法プロトコール・レジメン登録用紙

| | |
|-----------|------------------|
| 登録プロトコール名 | DTX + CPA (TC療法) |
| 診療科 | 乳腺外科 |
| 診療科責任者 | |
| 申請者名 | 西 隆 |
| 適応 | 乳癌 |
| 登録年月日 | 2018.03.30 |

| 抗がん剤名称 | 投与経路 | 標準投与量 |
|-------------|------|----------------------|
| ドセタキセル(DTX) | div | 75mg/m ² |
| エンドキサン(CPA) | div | 600mg/m ² |
| | | |
| | | |

| | | | |
|-----|------|-----|--|
| 承認 | 承認 | 承認 | |
| 委員長 | 副委員長 | 事務局 | |
| | | | |

投与スケジュール: 3週間毎

| 投与順 | Rp | 経路・時間 | 投与スケジュール | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|--|--|
| | | | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | |
| ① | デカドロン錠 8mg/日 (2×朝夕食後) | p.o | | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ② | 血管確保・フラッシュ用 生食 50mL | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ③ | グラニセトンバッグ 3mg/50mL + デキサート 6.6mg | div 15min | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ④ | ドセタキセル(75mg/m ²) + 5%ブドウ糖液 250mL | div 60min | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑤ | エンドキサン(600mg/m ²) + 生食2ホート 100mL | div 30min | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑥ | ②の残液でフラッシュ | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 浮腫予防の場合は、前日朝から3日間のデカドロン錠 16mg/日 経口投与を検討すること | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

開始予定日 あり なし 年 月 日