# 化学療法プロトコール・レジメン登録用紙

| 登録プロトコール名 | DTX+CPA+Tmab(TC+H療法) |
|---|---|
| 診療科 | 乳腺外科 |
| 診療科責任者 | |
| 申請者名 | 西　隆 |
| 適応 | 乳癌 |
| 登録年月日 | 2018.08.29 |

| 抗がん剤名称 | 投与経路 | 標準投与量 |
|---|---|---|
| ドセタキセル(DTX) | div | 75mg/$m^2$ |
| エンドキサン(CPA) | div | 600mg/$m^2$ |
| ハーセプチン(Tmab) | div | [初回] 8mg/kg |
| | | [2回目以降] 6mg/kg |

| 承認 | 承認 | 承認 | |
|---|---|---|---|
| 委員長 | 副委員長 | 事務局 | |
| | | | |

投与スケジュール: 3週毎 4コース

| 投与順 | Rp | 経路・時間 | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | デカドロン錠 8mg/日 (2×朝夕食後) | p.o | | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | | | |
| ② | 血管確保・フラッシュ用<br>生食 50mL | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | |
| ③ | グラニセトロンバッグ 3mg/50mL+デキサート 9.9mg | div<br>15min | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | |
| ④ | ドセタキセル(75mg/$m^2$)+生食250mL | div<br>60min | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | |
| ⑤ | エンドキサン(600mg/$m^2$)+生食100mL | div<br>30min | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | |
| ⑥ | フラッシュ用<br>生食 50mL | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | |
| ⑦ | [初回のみ] ハーセプチン(8mg/kg) + 生食 250mL | div<br>90min | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | [2回目以降] ハーセプチン(6mg/kg) + 生食 250mL | div<br>※30min | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | |
| ⑧ | ②,⑥いずれかの残液でフラッシュ | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | |

※初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降の投与時間は30分間まで短縮可

開始予定日　□あり　年　月　日　　□なし